



## El aborto en cifras: Encuesta a mujeres en el Perú

Esta fue una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP) por encargo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

### Metodología | Ficha técnica

#### TIPO Y TÉCNICA

Investigación cuantitativa mediante encuestas presenciales.

#### UNIVERSO

Mujeres entre los 18 y 49 años de edad del ámbito urbano que residen en hogares de las 25 regiones del Perú.

#### MUESTRA

El muestreo fue probabilístico, multietápico y estratificado por Nivelsocioeconómico (NSE). Se realizaron un total de 2400 encuestas a nivel nacional.

#### INSTRUMENTOS

Cuestionario estructurado, las encuestas fueron aplicadas de manera presencial.

#### MARGEN DE ERROR

A nivel nacional: +- 2  
A nivel macrorregional: +-4.5

#### TRABAJO DE CAMPO

Del 15 al 29 de octubre de 2018.

#### ENCUESTADORA

Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP).

# INCIDENCIA DEL ABORTO EN EL PERÚ


¿TE HAS REALIZADO ALGUNA VEZ UN ABORTO?

19%



de las mujeres peruanas entre los 18 y 49 años refiere haberse realizado un aborto.


Estas prevalencias no varían en las regiones. Sin embargo, la región **Oriente** parece tener las cifras más altas.



## PERFIL DE LAS MUJERES QUE ABORTAN

### Nivel socioeconómico

Encontramos mujeres que abortan en todos los niveles socioeconómicos, aunque la mayoría se encuentra en los niveles **C** y **D/E**.



### Hijos

2.5



Las mujeres que han abortado tienen en promedio **2.5** hijos.

### Nivel educativo

Son mujeres con diferentes niveles educativos. El aborto **no se limita a las mujeres con niveles educativos bajos**.




- Inicial o primaria: 9%
- Secundaria: 46%
- Formación superior de algún tipo: 45%

## Grupo de edad


Las mujeres abortan en todas las edades.

Porcentaje de mujeres que han abortado por grupo etario

● Sí ● NO



## ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍAS CUANDO TE REALIZASTE EL ÚLTIMO ABORTO? (SEGÚN GRUPO ETARIO)



## EXPERIENCIA DE LAS MUJERES EN SU ÚLTIMO ABORTO

En más de la mitad de los casos, las mujeres han acudido a un profesional de salud para realizarse un aborto. El método más usado es la **intervención quirúrgica**, seguido de las **pastillas**. (En más del 80% de los casos se usó alguno de estos métodos.)

### ¿HAS ACUDIDO A UN PROFESIONAL DE SALUD PARA REALIZAR EL ABORTO?

**Sí: 58%**  
**No: 42%**




### ¿QUÉ MÉTODOS SE USARON EN TU ÚLTIMO ABORTO?



Los **abortos quirúrgicos** son más frecuentes en las mujeres que acuden a un profesional de salud. Por otro lado, el **aborto con pastillas** es más frecuente en mujeres que no acuden al mismo.

Las mujeres que **SÍ** acudieron a un profesional de salud.



Las mujeres que **NO** acudieron a un profesional de salud.




- Aborto quirúrgico
- Aborto con pastillas
- No sabe
- Otro

Cerca de la **mitad** de las mujeres que tuvieron aborto quirúrgico requirió internamiento en un establecimiento de salud. Por otro lado, menos de la **quinta** parte de mujeres que abortaron con pastillas necesitó ser internada.



Internamiento en hospital, puesto de salud o clínica por causa de su último aborto\*

● Sí ● NO



\* Estas estadísticas solo consideran aquellos abortos realizados con pastillas o quirúrgicamente.

## CONCLUSIONES

- **A nivel nacional, el 19% de mujeres se han realizado un aborto.** El aborto ocurre a pesar de la prohibición legal que hay en el Perú.
- **La práctica del aborto es transversal a todos los niveles socioeconómicos.** Sin embargo, la mayor cantidad de mujeres que reportaron un aborto fueron de los estratos económicos **medios y bajos.**
- **Las mujeres que reportan una experiencia de aborto son de todas las edades;** pero se evidencia una mayor frecuencia entre mujeres jóvenes (menores de 30 años).
- **El 58% de las mujeres acudieron a un profesional de salud para interrumpir el embarazo;** la gran mayoría de mujeres de este grupo tuvo un aborto quirúrgico.
- **Se observa que el método más usado es la intervención quirúrgica, el cual representa el 47%.** El segundo método más usado son las pastillas, el cual representa el 34% de los abortos a nivel nacional.
- El 17% de mujeres que interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser hospitalizadas; **mientras que este porcentaje asciende a 49% entre aquellas que tuvieron un aborto quirúrgico.**

**El aborto es una realidad y continuará siéndolo.** Su realización no debe exponer a las mujeres a situaciones de criminalización ni a prácticas inseguras que pongan en riesgo su salud y sus vidas.

Con el apoyo de:



**Bélgica**  
socio para el desarrollo